

# Vacunas durante el embarazo

Protegiendo a usted y a su bebé



## SEGURIDAD DE LAS VACUNAS EN EL EMBARAZO

Las vacunas recomendadas durante el embarazo han sido estudiadas cuidadosamente y son seguras para usted y su bebé. **Múltiples estudios no han mostrado un aumento en el riesgo de aborto espontáneo, malformaciones congénitas ni problemas de fertilidad.**

La vacunación ayuda a prevenir enfermedades graves en las personas embarazadas y protege a los bebés de infecciones durante sus primeros meses de vida.

*Esta información es proporcionada solamente con fines educativos. NHMA no respalda ni recomienda productos específicos. Hable con su proveedor de atención médica sobre cuáles vacunas son adecuadas para usted.*

## PROTEGIÉNDOLA A USTED Y A SU BEBÉ

Un paso a la vez



### ANTES DEL NACIMIENTO

Al vacunarse, protege a su bebé porque sus defensas (anticuerpos) pasan a través de la placenta.

### DESPUÉS DEL NACIMIENTO

Los anticuerpos protegen al bebé durante sus primeros meses de la vida, cuando aún es demasiado joven para recibir ciertas vacunas



### PARA PADRES

Vacunarse en el embarazo previene complicaciones graves y es un acto de amor y protección para usted y su bebé.



# Vacunas durante el embarazo

Protegiendo a usted y a su bebé

Esta información es proporcionada solamente con fines educativos. NHMA no respalda ni recomienda productos específicos. Hable con su proveedor de atención médica sobre cuáles vacunas son adecuadas para usted.

## VACUNAS COMÚNMENTE ADMINISTRADAS DURANTE EL EMBARAZO

Vacuna	Cuándo se Administra Generalmente	Por Qué es Importante	¿Se repite?
<b>Influenza (Gripe)</b>	En cualquier trimestre, preferiblemente antes o durante la temporada de gripe	Ayuda a prevenir enfermedades graves durante el embarazo y proporciona anticuerpos que protegen al bebé después del nacimiento.	Sí — en cada embarazo, durante la temporada.
<b>COVID-19</b>	En cualquier trimestre	Ayuda a prevenir enfermedades graves durante el embarazo y proporciona anticuerpos que protegen al bebé después del nacimiento.	Sí — en cada embarazo, especialmente si hay una formulación actualizada disponible.
<b>Tdap (Tétanos, Difteria y Tos Ferina)</b>	Entre las semanas 27–36 del embarazo	Protege a los recién nacidos de la tos ferina hasta que puedan vacunarse.	Sí — en cada embarazo.
<b>Hepatitis B (VHB)</b>	En cualquier trimestre si no tiene inmunidad previa o no ha sido vacunada anteriormente.	Ayuda a proteger contra infección de hepatitis ambos para la persona embarazada y al bebé.	No se repite en embarazos futuros. Es una serie única de 2 a 3 dosis y, una vez confirmada la inmunidad, no se administra de rutina nuevamente. Los refuerzos solo se recomiendan para ciertos grupos de alto riesgo.
<b>RSV (Virus Respiratorio Sincitial)</b> <small>Los mAbs son una opción y deben utilizarse cuando se esté fuera del período estacional indicado para la vacuna materna contra el VRS. (Entre febrero y marzo, los bebés deben recibir un mAb.)</small>	Entre las semanas 32–36, durante la temporada de VRS (septiembre–enero)	Ayuda a proteger a los bebés contra VRS en sus primeros 6 meses de vida	No, solo se administra una vez. En un embarazo futuro, el recién nacido debe recibir un anticuerpo monoclonal contra el RSV si nace durante la temporada de RSV.

\*Los mAbs contra el VRS se recomiendan para todos los bebés menores de 8 meses de edad, nacidos antes y durante la temporada de VRS, si no se administró la inmunización materna contra el VRS.